

Medicines During Pregnancy (Medicamentos Durante el Embarazo)

During pregnancy, medications should be avoided.
However, if needed, there are no known adverse
effects of the following medications:

(Durante el embarazo, usted debe evitar tomar medicamento.
Pero, si el medicamento es realmente necesario,
usted puede tomar los siguientes medicamentos:)

Constipation (Estreñimiento)

Metamucil, Sugar-free (Sin azúcar)

Colace

Natural Bran -- high fiber diet & extra liquids

(dieta de alta fibra y muchos líquidos)

Nausea

Emetrol (Not for use by diabetics) (No para diabéticas)

Vitamin B-6, 25 mg. 3 times/day (not more than 100 mg. per day.)

25 mg. 3 veces por día (No más de 100 mg. diario)

Sea-Bands

Diarrhea (Diarrea)

Kaopectate

Pepto Bismol

Pain (Dolor)

Tylenol

Antacids (Acidés)

Tums

Zantac

Pepcid

Mylanta (no aluminum)

Maalox (no aluminum)

Mylicon-80

Gaviscon

Allergy (Alérgia)

Allegra

Claritin

Zyrtec

Only after 12 weeks of pregnancy (Solamente después de 12 semanas de embarazo)

Colds (Resfríos)

Robitussin -- cough suppressant

Benadryl

Zicam

Cepacol

Mucinex

Tylenol Cold with Sinus

Hemorrhoids (Hemorroides)

Preparation H

Anusol

**If you have the following symptoms, you must make an
appointment for an office visit:
(Si usted tiene cualquier de los siguientes síntomas, debe de
hacer cita para un chequeo:)**

Fever/Fiebre

Severe sore throat/Dolor de garganta severo

Ear Ache/Dolor de oído

Chest/Back pain with cough/Dolor de pecho ó espalda con tos

Wheezing/Ruido al respirar